

# 症例 1

患者情報 年齢:85歳 / 性別:女性 / 体重35.1kg / やせ型 / 円背 / 杖歩行

生活状況: 独居、数年前に夫と死別

趣向歴・サプリメント: なし

アレルギー歴: なし

患者が持参した処方箋 <最初の処方(定期処方:毎月28日処方) 201x年7月1日>

## A 消化器内科医院

	薬品名	数量	不適切と考える理由
1	プロプレス錠 8mg (カンデサルタン シレキセチル)	1回 1錠	
2	エディロールカプセル0.75 (エルデカルシトール)	1回 1 Cap	
3	パップフォー錠 20mg (プロビベリン塩酸塩) 1日1回 朝食後 28日分	1回 1錠	
4	ドクマチール錠 50mg (スルピリド) 1日3回 夕食後 28日分	1回 1錠	
5	ガスターD錠 20mg (ファモチジン) 1日1回 就寝前 28日分	1回 1錠	
6	トランコロン錠 7.5mg (メベンゾラード臭化物)	1回 1錠	
7	ビオフェルミン錠剤(ビフィズス菌製剤) 1日3回 毎食後 28日分	1回 1錠	
(頓用)			
8	ロペミンカプセル1mg (塩酸ロペラミド) 下痢時 30回分	1回 1 Cap	
9	デバス錠 0.25mg (エチゾラム) 不安時 20回分	1回 1錠	
10	エネーボ配合経腸液 250ml 食欲不振時 20回分	1回 1本	

## 【処方提案】

## 症例 1

患者情報 年齢:85歳 / 性別:女性 / 体重35.1kg / やせ型 / 円背 / 杖歩行

生活状況: 独居、数年前に夫と死別

趣向歴・サプリメント: なし

アレルギー歴: なし

既往歴:

- ・尿路結石 (201X.11) → 体外衝撃波結石破砕術 (ESWL) 施行
- ・高血圧症
- ・過敏性腸症候群 (下痢型)
- ・過活動膀胱
- ・骨粗鬆症
- ・慢性胃炎
- ・胃潰瘍
- ・不安神経症

現病歴:

- ・毎回本人が来局。下痢などの消化器症状の訴えがあるも現在は落ち着いている。最近、食欲がなくなってきた話が増えてきた。

## 検査値

身長を聞き取り、血液検査の結果を確認できた。

身長140cm、体重35.1kg、WBC $6.600 / \mu\text{L}$ 、RBC  $307 \times 10^4 / \mu\text{L}$ 、Hb  $9.3\text{g} / \text{dL}$ 、Ht 27.5%、MCV 90fL、MCH 30.3pg、MCHC 33.8%、PLT  $28,7 \times 10^4 / \mu\text{L}$ 、TP  $7.2\text{g} / \text{dL}$ 、AST 21U/L、ALT 11U/L、 $\gamma\text{-GTP}$  14 U/L、UA 6.6mg/dL、BUN 26.2mg/dL、BS 104mg/dL、CRE 1.1mg/dL、eGFR 36.09mL/min/1.73m<sup>2</sup>、Na 144mEq/L、K3.4mEq/L、Cl 102mEq/L、Ca 9.2mg/dL、CRP 0.13mg/dL

## 症例 2

患者情報 年齢:84歳 / 性別:女性 / 身長151cm / 体重52kg

生活状況 : 3人兄妹の2番目、兄弟に認知症はいない。父が胃がん、母が高血圧、脳梗塞。

趣向歴・サプリメント : 飲酒なし、喫煙10本/日を35年間、55歳頃まで。

アレルギー歴 : 特記事項なし。

### 患者が持参した処方箋 (最初の処方箋)

A 精神科クリニック			
	薬品名	数量	不適切と考える理由
1	アリセプトD錠10mg (ドネベジル塩酸塩)	1回 1錠	
2	タケプロンOD錠15mg (ランソプラゾール) 1日1回 朝食後	1回 1錠	
3	ツムラ抑肝散エキス顆粒2.5g (抑肝散エキス) 1日3回 毎食前	1回 1包	
4	ビオフェルミン錠剤 (ビフィズス菌製剤) 1日3回 毎食後	1回 1錠	
5	ジプレキサ錠 10mg (オランザピン)	1回 1錠	
6	パップフォー錠 10mg (プロピペリン塩酸塩) 1日1回 就寝前	1回 1錠	

B 総合病院整形外科			
	薬品名	数量	不適切と考える理由
1	ロキソニン錠 60mg (ロキソプロフェナトリウム水和物)	1回 1錠	
2	セルベックスカプセル 50mg (テプレメン) 1日3回 毎食後	1回 1 Cap	
3	リリカカプセル 75mg (プレガバリン) 1日2回 朝夕食後	1回 1 Cap	

### 【処方提案】

## 症例 2

患者情報 年齢:84歳 / 性別:女性 / 身長151cm / 体重52kg

生活状況 : 3人兄妹の2番目、兄弟に認知症はない。父が胃がん、母が高血圧、脳梗塞。

趣向歴・サプリメント : 飲酒なし、喫煙10本/日を35年間、55歳頃まで。

アレルギー歴 : 特記事項なし。

### 生活状況:

・夫とは早くに死別。仕事と子育てを両立させていた。運転が好きで77歳頃まで自動車を運転し山へ行くのが好きだったが、交通事故を起こしたのをきっかけに運転をしなくなり、以降元気が無くなった。徐々に認知症周辺症状が出現し、現在は何とかデイサービスに週3回通っている。要介護3。長女家族と暮らしている。

・認知症のため、簡単は会話はできるが、自分の年齢、日付、場所などは答えることができない。トイレまでは歩行可能だが、最近では日中寝ていることが多く、周りに誰もいなくなると居間で寝ていることが多い。また、家族の名前も出なくなってきた。

### 既往歴:

- ・高血圧(68歳)
- ・早期胃がん 内視鏡的粘膜切除術(70歳)
- ・胃がん再発 噴門部部分切除(71歳)
- ・アルツハイマー型認知症、過活動膀胱。腰椎圧迫骨折・腰部脊柱管狭窄症(80歳)
- ・左大腿骨頸部骨折手術、(84歳)

### 現病歴:

・患者は4年ほど前から認知症で近隣のA精神科クリニックにかかるようになり、処方薬をもらっている。当初はアリセプトを処方開始されていたが、2年ほど前から物取られ妄想が出現し、時折興奮したりしていたため、徐々に服用薬剤が増えてきていた。4か月前も夜中に大声をあげている時期が続き、ジプレキサを追加処方されたところ、少し静かに寝ているようになった。3か月前に夜間自宅で転倒し、左大腿骨頸部骨折の診断でB総合病院に入院。手術を行い1ヶ月ほど入院していた。現在はB総合病院を退院し、外来リハビリテーションを目的に定期的にB総合病院の外来通院をしている。また、A精神科クリニックにも定期通院している。

・B総合病院中に、誤嚥性肺炎にかかり抗菌薬治療を受けたが、今回が初めてではなく、以前にも一度誤嚥性肺炎を起こしたことがあった。

今回、B総合病院を受診した際に、主介護者の三女に連れられて薬局に来客された。

## 検査値

B総合病院入院中の検査結果を持参している。

WBC 6.900 /  $\mu$ L, RBC 315 x 10<sup>4</sup> /  $\mu$ L, Hb 10.2g / dL, Ht 31.3%, PLT 11.5 x10<sup>4</sup> /  $\mu$ L, MCV 99.4 fL, MCH 32.4 pg, MCHC 32.6%, T-Bil 1.52 mg/dL,  $\gamma$ -GTP 26U/L, AST (GOT) 31 U/L, ALT (GPT) 25U/L, LDH 174 U/L, CK 44 U/L, BUN 21.3mg /dL, CRE 0.91 mg/dL, eGFRcr 44.3mL/min/1.73 m<sup>2</sup>, Na 143mEq/L, K 4.5mEq/L, Cl 112mEq/L, TC 140mg/dL, GLU (随時) 160mg/dL